

非小細胞肺がん

術前補助

【術前補助】ニボルマブ + CBDCA/PEM

主な使用目的

術前補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	術前に3コース 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

術後補助

CDDP/VNR

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	術後補助の場合は4コース実施
ビンレルビン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

【術後】アテゾリズマブ

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	CDDP併用の術後補助レジメン後 最長1年間

非小細胞肺がん

切除不能・進行再発

BEV

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	

PEM/BEV

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

CBDCA/GEM/BEV

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 4	D1	点滴静注	60分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 維持療法としてBEVへ移行
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

CBDCA/GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 4	D1	点滴静注	60分間	21日間	
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		

CBDCA/nab-PTX

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間	21日間	
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

非小細胞肺がん

CBDCA/PEM/BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 維持療法としてPEM/BEVへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

CBDCA/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

CBDCA/PTX/BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	28日間	4-6コース終了時に奏功していれば 【維持療法】BEVへ移行
パクリタキセル	70 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間		
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

CBDCA/PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	28日間	
パクリタキセル	70 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間		

CBDCA

主な使用目的

局所進行

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	30 mg/m ²	D1-5	点滴静注	60分間	7日間	放射線療法と併用 4コース実施

CDDP/CPT-11

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	28日間	
イリノテカン	60 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	90分間		

非小細胞肺がん

CDDP/GEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	80 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		

CDDP/PEM/BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 維持療法としてPEM/BEVへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

CDDP/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

DTX/RAM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	60 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	
ラムシルマブ	10 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		

DTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	60 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	

Erlotinib/BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エルロチニブ	150 mg/body	連日	経口	分1	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん
ヘパシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

非小細胞肺がん

Erlotinib/RAM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エルロチニブ	150 mg/body	連日	経口	分1	14日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん
ラムシルマブ	10 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

GEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

nab-PTX

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

PEM

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注

S1/CBDCA

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2	21日間	
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		

VNR

主な使用目的					進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ビノレルビン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与	21日間	

非小細胞肺がん

wCBDCA/PTX conc TRT

主な使用目的

局所進行

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 2	D1,8,15 22,29,36	点滴静注	60分間	42日間	放射線療法と併用
パクリタキセル	40 mg/m ²		点滴静注	60分間		奏功確認後、デュルバルマブによる 地固め療法へ移行

【CRT後】デュルバルマブ維持療法

主な使用目的

局所進行

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	wCBDCA/PTX conc TRT後の 地固め療法
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		最大13コース（1年間）まで ※添付文書改訂による用法用量変更

オシメルチニブ + CBDCA/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オシメルチニブ	80 mg/body	連日	経口	分1	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 4コース終了時に奏功していれば 【維持】オシメルチニブ + PEMへ移行 葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

オシメルチニブ + CDDP/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オシメルチニブ	80 mg/body	連日	経口	分1	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 4コース終了時に奏功していれば 【維持】オシメルチニブ + PEMへ移行 葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】オシメルチニブ + PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
オシメルチニブ	80 mg/body	連日	経口	分1	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注

非小細胞肺がん

【単剤】【維持】アテゾリズマブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	

アテゾリズマブ + CBDCA/nab-PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば 【維持】アテゾリズマブへ移行
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

アテゾリズマブ + CBDCA/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 【維持】アテゾリズマブ + PEMへ移行 葉酸（パンビタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

アテゾリズマブ + CDDP/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 【維持】アテゾリズマブ + PEMへ移行 葉酸（パンビタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】アテゾリズマブ + PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（パンビタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

非小細胞肺がん

アテゾリズマブ + CBDCA/PTX/BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	4-6コース終了時に奏功していれば 【維持】アテゾリズマブ + BEVへ移行
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		
パクリタキセル	200 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間		
ペバシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

【維持】アテゾリズマブ + BEV

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	1200 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	
ペバシズマブ	15 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		

ニボルマブ (q2w)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

ニボルマブ (q4w)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	

ニボルマブ + イピリムマブ + CBDCA/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1,22	点滴静注	30分間	42日間	1コース終了後は下記維持療法へ移行 ニボルマブ(q2w)+イピリムマブ または ニボルマブ(q3w)+イピリムマブ 葉酸（バンピタン末）連日内服 VB12筋注
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 5	D1,22	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1,22	点滴静注	10分間		

非小細胞肺がん

ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA/PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1,22	点滴静注	30分間	42日間	1コース終了後は下記維持療法へ移行 ニボルマブ(q2w)+イピリムマブ または ニボルマブ(q3w)+イピリムマブ
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 6	D1,22	点滴静注	60分間		
パクリタキセル	200 mg/m ²	D1,22	点滴静注	180分間		

ニボルマブ（q2w）+イピリムマブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1,15,29	点滴静注	30分間	42日間	
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

ニボルマブ（q3w）+イピリムマブ

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1,22	点滴静注	30分間	42日間	
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

非小細胞肺がん

【単剤】【維持】ペムブロシマブ（q3w）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	

【単剤】【維持】ペムブロシマブ（q6w）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロシマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	

ペムブロシマブ+CBDCA/nab-PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば 【維持】ペムブロシマブへ移行
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

ペムブロシマブ+CBDCA/PTX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば 【維持】ペムブロシマブへ移行 アブラキサン供給停止に伴い登録
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		
パクリタキセル	200 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間		

ペムブロシマブ+CBDCA/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば 【維持】ペムブロシマブ+PEMへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

非小細胞肺がん

ペムブロリズマブ + CDDP/PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	4コース終了時に奏功していれば 【維持】ペムブロリズマブ + PEMへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】ペムブロリズマブ（q3w） + PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】ペムブロリズマブ（q6w） + PEM

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1,22	点滴静注	10分間		

①-④ Durva + Treme + CBDCA/PEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

⑤、⑦以降 Durva + PEM（Durva + Treme + CBDCA/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

⑥ Durva + Treme + PEM（Durva + Treme + CBDCA/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

非小細胞肺癌

①-④ Durva + Treme + CDDP/PEM

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

⑤、⑦以降 Durva + PEM（Durva + Treme + CDDP/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

⑥ Durva + Treme + PEM（Durva + Treme + CDDP/PEM）

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

非小細胞肺がん

①-④ Durva + Treme + CBDCA/nab-PTX

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 6	D1	点滴静注	60分間		

⑤、⑦以降 Durva (Durva + Treme + CBDCA/nab-PTX)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	

⑥ Durva + Treme (Durva + Treme + CBDCA/nab-PTX)

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
トレメリムマブ	75 mg/body	D1	点滴静注	60分間		

非小細胞肺がん

初回 アミバンタマブ+ラゼルチニブ（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	350 mg/body	D1	点滴静注	4時間	28日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん
	700 mg/body	D2	点滴静注	4時間		
	1050 mg/body	D8,15,22	点滴静注	2-3時間		
ラゼルチニブ	240 mg/body	連日	経口	1日1回		

②以降 アミバンタマブ+ラゼルチニブ（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1050 mg/body	D1	点滴静注	2時間	14日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん
ラゼルチニブ	240 mg/body	連日	経口	1日1回		

非小細胞肺がん

初回 アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	350 mg/body	D1	点滴静注	4時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
	1050 mg/body	D2	点滴静注	6時間		
	1400 mg/body	D8,15	点滴静注	3-4時間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

② アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1400 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

③-④ アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1750 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 4コース目終了後に奏功していれば、 【維持】アミバンタマブ+PEMへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】アミバンタマブ+PEM（体重80kg未満） 主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1750 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺がん 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		