

更新分（2025年5月～2025年10月）

非小細胞肺癌

初回 アミバンタマブ+ラゼルチニブ（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	350 mg/body	D1	点滴静注	4時間	28日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌
	700 mg/body	D2	点滴静注	4時間		
	1050 mg/body	D8,15,22	点滴静注	2-3時間		
ラゼルチニブ	240 mg/body	連日	経口	1日1回		

②以降 アミバンタマブ+ラゼルチニブ（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1050 mg/body	D1	点滴静注	2時間	14日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌
ラゼルチニブ	240 mg/body	連日	経口	1日1回		

初回 アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	350 mg/body	D1	点滴静注	4時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
	1050 mg/body	D2	点滴静注	6時間		
	1400 mg/body	D8,15	点滴静注	3-4時間		
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

② アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1400 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

③-④ アミバンタマブ+CBDCA/PEM（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1750 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌 4コース目終了後に奏功していれば、 【維持】アミバンタマブ+PEMへ移行 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	1時間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【維持】アミバンタマブ+PEM（体重80kg未満）			主な使用目的		進行再発	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アミバンタマブ	1750 mg/body	D1	点滴静注	2時間	21日間	EGFR遺伝子変異陽性肺癌 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

【術前補助】ニボルマブ+CBDCA/PEM			主な使用目的		術前補助	
使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	術前に3コース 葉酸（バンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間		
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

更新分（2025年5月～2025年10月）