

悪性胸膜中皮腫

CBDCA/PEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カルボプラチン	AUC 5	D1	点滴静注	60分間	21日間	葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

CDDP/PEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	75 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間		

CDDP/GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	28日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

PEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペメトレキセド	500 mg/m ²	D1	点滴静注	10分間	21日間	葉酸（パンピタン末）連日内服 3コース毎にVB12筋注

ニボルマブ[®] (q2w) + イピリムマブ[®]

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1,15,29	点滴静注	30分間	42日間	
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

ニボルマブ[®] (q3w) + イピリムマブ[®]

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1,22	点滴静注	30分間	42日間	
イピリムマブ	1 mg/kg	D1	点滴静注	30分間		

悪性胸膜中皮腫

q2w ニボルマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

q4w ニボルマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	

VNR

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ビノレルピン	25 mg/m ²	D1、8	点滴静注	5分以内	21日間	