

乳がん

ホルモン治療

リュープロレリン各種

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
リュープロレリン	3.75 mg/body	D1	皮下注		4週間	
リュープリン®SR	11.25 mg/body	D1	皮下注		12週間	
リュープリン®PRO	22.5 mg/body	D1	皮下注		24週間	

ゴセレリン

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゾラデックス®LA	10.8 mg/body	D1	皮下注		12-13週間	

フルベストラント

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フルベストラント	500 mg/body	D1,15,29 その後4週毎	筋注		28日間	左右の臀部に250mg/筒ずつ筋注

周術期

EC (90/600)

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシン	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

dose-dense EC

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシン	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	14日間	原則4コース実施 peg-G-CSF併用
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

AC (60/600)

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドキソルピシン	60 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

乳がん

TC (DTX/CPA)

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	原則4コース実施
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

DTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	原則4コース実施

dose-dense PTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	175 mg/m ²	D1	点滴静注	180分間	14日間	原則4コース実施 peg-G-CSF併用

wPTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	7日間	原則12コース実施

HP + DTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施
ベルツズマブ (2回目以降)	420 mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

乳がん

HP+wPTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施
ベルツズマブ (2回目以降)	420 mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間		

HP

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例 原則13コース実施 (抗HER2療法として1年間)
ベルツズマブ (2回目以降)	420 mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					

フェスゴ配合皮下注

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フェスゴ配合皮下注IN	初回投与	D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例 前回投与から6週間以上のときには、 フェスゴ配合皮下注INから再開
フェスゴ配合皮下注MA	維持投与	D1	皮下注	5分間		

T-DM1

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則14コースまで (抗HER2療法として1年間)

乳がん

HER+ DTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則4コース実施
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

wHER+ PTX

主な使用目的 術前補助 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	7日間	HER2陽性症例 原則12コース実施
トラスツズマブ (2回目以降)	2 mg/kg					
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

HER

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例 原則13コース実施 (抗HER2療法として1年間)
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					

ペムブロリズマブ + EC

主な使用目的 術前補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	トリプルネガティブ乳がん
エビルピシシ	90 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与		
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

ペムブロリズマブ + wCBDCA/wPTX

主な使用目的 術前補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	トリプルネガティブ乳がん
カルボプラチン	AUC 1.5	D1,8,15	点滴静注	1時間		
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	1時間		

乳がん

ペムブロリズマブ (q6w)

主な使用目的

術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	

乳がん

進行再発

BEV/wPTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘパシズマブ	10 mg/kg	D1,15	点滴静注	90分間	28日間	
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間		

CPT-11 (A)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

DTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間	21日間	

EC (75/600)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エビルピシシ	75 mg/m ²	D1	点滴静注	全開投与	21日間	
シクロホスファミド	600 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間		

Eribulin

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
エリブリン	1.4 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与	21日間	

GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1250 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	

nab-PTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260 mg/m ²	D1	点滴静注	30分間	21日間	

乳がん

VNR

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ビンレルピン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与	21日間	

wPTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	60分間	28日間	

アテゾリズマブ/nab-PTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アテゾリズマブ	840 mg/body	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	PD-L1陽性の トリプルネガティブ乳がん
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	30分間		

ペムブロリズマブ + GEM/CBDCA

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	PD-L1陽性の トリプルネガティブ乳がん
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	D1,8	点滴静注	30分間		
カルボプラチン	AUC 2	D1,8	点滴静注	60分間		

HER+Cape (B法)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
カベシタピン	B法 (※添付文書参照)					

乳がん

HER+ Eribulin

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
エリブリン	1.4 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HER+S1

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		

HER+ VNR

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					
ビネルルピン	25 mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HER

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	6 mg/kg					

乳がん

HP + Cape (B法)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ (2回目以降)	420	mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg					
カベシタピン	B法 (※添付文書参照)		D1-14	経口	分2		

HP + DTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ (2回目以降)	420	mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg					
ドセタキセル	75	mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

HP + Eribulin

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ (2回目以降)	420	mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg					
エリブリン	1.4	mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

乳がん

HP+VNR

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ (2回目以降)	420	mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg					
ビンレルピン	25	mg/m ²	D1,8	点滴静注	全開投与		

HP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ベルツズマブ (初回)	840	mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	HER2陽性症例
ベルツズマブ (2回目以降)	420	mg/body					
トラスツズマブ (初回)	8	mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ (2回目以降)	6	mg/kg					

フェスゴ配合皮下注

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フェスゴ配合皮下注IN	初回投与		D1	皮下注	8分間	21日間	HER2陽性症例 前回投与から6週間以上のときには、 フェスゴ配合皮下注INから再開
フェスゴ配合皮下注MA	維持投与		D1	皮下注	5分間		

T-DM1

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブエムタンシン	3.6	mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例

T-Dxd (医師限定)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量		投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例