

# 胆道がん

## 進行再発

### GCS

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	30分間	14日間	
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間		
S1	※添付文書参照	D1-7	経口	分2		

### GEM/CDDP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	60分間	21日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		

### GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	30分間	28日間	

### GS

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間	21日間	【S1用量】 BSA < 1.25 : 60mg/日 1.25 ≤ BSA < 1.5 : 80mg/日 BSA ≥ 1.5 : 100mg/日
S1	※備考参照	D1-14	経口	分2		

### S1/GEM (1,15)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,15	点滴静注	30分間	28日間	
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		

# 胆道がん

## デュルバルマブ+GEM/CDDP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	21日間	8コース終了時に奏効していれば、 【維持療法】デュルバルマブへ移行
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	60分間		

## 【維持療法】デュルバルマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
デュルバルマブ (体重30kg超)	1500 mg/body	D1	点滴静注	60分間	28日間	
デュルバルマブ (体重30kg以下)	20 mg/kg	D1	点滴静注	60分間		

## ペムブロリズマブ+GEM/CDDP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	最大8コースまで 奏効していれば、 【維持療法】ペムブロリズマブ+GEMへ 移行
シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	60分間		
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		

## 【維持】ペムブロリズマブ+GEM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ペムブロリズマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	
ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	D1,8	点滴静注	30分間		