

頭頸部がん

CDDP+RT

主な使用目的 術後補助 局所進行

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
シスプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	21日間	全3コース

C-mab+RT

主な使用目的 局所進行

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
セツキシマブ (初回)	400 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	7日間	原則7コース実施
セツキシマブ (2回目以降)	250 mg/m ²		点滴静注	60分間		

C-mab+FP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
セツキシマブ (初回)	400 mg/m ²	D1,8,15	点滴静注	120分間	21日間	
セツキシマブ (2回目以降)	250 mg/m ²		点滴静注	60分間		
フルオウラシル	1000 mg/m ²	D1-4	点滴静注	24時間		
シスプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

C-mab/PTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
セツキシマブ (初回)	400 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間	7日間	
セツキシマブ (2回目以降)	250 mg/m ²		点滴静注	60分間		
パクリタキセル	80 mg/m ²	D1	点滴静注	60分間		

FP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
フルオウラシル	1000 mg/m ²	D1-5	点滴静注	24時間	21日間	
シスプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

ニボルマブ

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

ヘムブロシマブ+FP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	最大6コースまで それ以降はヘムブロシマブ単剤療法
フルオウラシル	1000 mg/m ²	D1-4	点滴静注	24時間		
シスプラチン	100 mg/m ²	D1	点滴静注	120分間		

ヘムブロシマブ (q3w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムブロシマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	

ヘムブロシマブ (q6w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ヘムブロシマブ	400 mg/body	D1	点滴静注	30分間	42日間	