

# 胃がん

## 術後補助

### CAPOX(XELOX)

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	原則8コース実施
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

### S1/DTX

主な使用目的 術後補助

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2	21日間	①コースはS1のみ ②-⑦コースはDTX併用 ⑧以降はS1のみ継続 (2投1休または4投2休) 合計1年間実施
DTX	40 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間		

## 進行再発

### CAPOX(XELOX)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

### CPT-11(A)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	90分間	28日間	

### CPT-11(B)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	D1,15	点滴静注	90分間	35日間	

### DTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	60分間	21日間	

### G-SOX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2	21日間	
オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

# 胃がん

## mFOLFOX6

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間	14日間	CVポート レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与 携帯型インフューザーポンプ使用
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		

## nab-PTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	30分間	21日間	

## RAM/nab-PTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	30分間		

## RAM/wPTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1,15	点滴静注	60分間	28日間	
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	30分間		

## RAM

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1	点滴静注	60分間	14日間	

## RAM/TAS-102

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トリフルリジン・チピラシル	※添付文書参照	D1-5,8-12	経口	分2	28日間	
ラムシルマブ	8 mg/kg	D1,15	点滴静注	60分間		

## SP (S1/CDDP)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	※添付文書参照	D1-21	経口	分2	35日間	
シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	D8	点滴静注	120分間		

# 胃がん

## wPTX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	点滴静注	60分間	28日間	

## XP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

## ニボルマブ(q2w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	

## ニボルマブ(q4w)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	480 mg/body	D1	点滴静注	30分間	28日間	

## HER/CAPOX(XELOX)

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

## HER/SOX

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

## HER/XP

主な使用目的 進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法（※添付文書参照）	D1-14	経口	分2	21日間	HER2陽性例
トラスツズマブ（初回）	8 mg/kg	D1	点滴静注	90分間		
トラスツズマブ（2回目以降）	6 mg/kg					
シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

# 胃がん

## HER/mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ (初回)	6 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	14日間	HER2陽性症例
トラスツズマブ (2回目以降)	4 mg/kg					
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		

## T-Dxd

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
トラスツズマブ デルクスデカン	6.4 mg/kg	D1	点滴静注	90分間	21日間	HER2陽性症例

## ニボルマブ + CAPOX(XELOX)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	HER2陰性症例
カベシタピン	C法 (※添付文書参照)	D1-14	経口	分2		
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

## ニボルマブ + mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	240 mg/body	D1	点滴静注	30分間	14日間	HER2陰性症例
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		

## ニボルマブ + SOX

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ニボルマブ	360 mg/body	D1	点滴静注	30分間	21日間	HER2陰性症例
S1	※添付文書参照	D1-14	経口	分2		
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

## ベムプロリスマブ/CAPOX(XELOX)

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
カベシタピン	C法 (※添付文書参照)	D1-14	経口	分2	21日間	
ベムプロリスマブ	200 mg/body	D1	点滴静注	30分間		
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		

# 胃がん

## 【初回】ゾルベツキシマブ/mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゾルベツキシマブ	800 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	医師指示	14日間	CLDN18.2陽性の場合
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		CVポート
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		携帯型インフューザーポンプ使用
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		

## 【②以降】ゾルベツキシマブ/mFOLFOX6

主な使用目的

進行再発

使用薬剤	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース	備考
ゾルベツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	医師指示	14日間	CLDN18.2陽性の場合
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		CVポート
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	120分間		レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与
フルオウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	全開投与		携帯型インフューザーポンプ使用
フルオウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	D1	点滴静注	46時間		